

MS-A010{2,3,4,5} (SCI, ELEC\*, ENG\*)  
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1  
Luento 4: Derivaatta

Pekka Alestalo, Jarmo Malinen


Aalto-yliopisto, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

August 26, 2020

# Derivaatta

Erilaisia lähestymistapoja:

- geometrinen (käyrän tangentti sekanttien raja-asentona)



- fysikaalinen (ajasta riippuvan funktion hetkellinen muutosnopeus).

## Esimerkki

Kappaleen 1-ulotteisen liikkeen paikkakoordinaatti on  $x = x(t)$  hetkellä  $t$ . Sen hetkellinen nopeus on keskinopeuksien raja-arvo:

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}.$$

## Määritelmä

Oletetaan, että funktio  $f$  on määritelty jollakin välillä  $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ . Sen derivaatta pisteessä  $x_0$  on

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

jos raja-arvo olemassa. Funktio on derivoituva, jos sillä on derivaatta jokaisessa määrittelyjoukon (= avoin väli) pisteessä.

Merkintöjä:

$$f'(x_0) = Df(x_0) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}, \quad f' = Df = \frac{df}{dx}.$$

# Korkeamman kertaluvun derivaatat

Jos funktion derivaatta  $f'(x)$  on määritelty jollakin avoimella välillä  $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ , niin voidaan tutkia funktion  $f'$  erotusosamäärää pisteessä  $x_0$ . Näin saadaan toisen kertaluvun derivaatta

$$f''(x_0) = D^2 f(x_0) = \left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=x_0}.$$

Jatkamalla samaan tapaan voidaan määritellä korkeamman kertaluvun derivaatat  $f'''(x), f^{(4)}(x), \dots$

Merkintä:

$$C^n(]a, b[) = \{f: ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ on } n \text{ kertaa derivoituva välillä } ]a, b[ \\ \text{ja } f^{(n)} \text{ on jatkuva}\}$$

Tällaisia funktioita kutsutaan  **$n$  kertaa jatkuvasti derivoituviksi**.

Derivaatan määritelmä johtaa approksimaatioon

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \Leftrightarrow f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Oikean puoleinen lauseke on funktion  $f$  **linearisointi** eli **differentiaali** pisteessä  $x_0$ . Sille käytetään merkintää  $df$ .

Linearisoinnin kuvaaja

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

on funktion kuvaajan pisteeseen  $(x_0, f(x_0))$  asetettu tangenttisuora.

Myöhemmin käsitellään funktion  $f$  approksimointia myös korkeamman asteen polynomien avulla (Taylor-polynomi).

# Derivaatan fysikaalinen tulkinta

- Jos  $x = x(t)$  on kappaleen yksiulotteisen liikkeen paikkakoordinaatti hetkellä  $t$ , niin sen hetkellinen nopeus on  $v(t) = x'(t) = \dot{x}(t)$ . Näistä viimeinen on tavallinen merkintä fysiikassa.
- Vastaavalla tavalla  $a(t) = v'(t) = x''(t) = \ddot{x}(t)$  on kappaleen hetkellinen kiihtyvyys.
- Yleisemmin: Ajasta riippuvan funktion  $f(t)$  hetkellinen muutosnopeus on  $f'(t)$ .

## Esimerkki

Johda funktion  $f(x) = x^2$  derivaatta kohdassa  $x_0$ .

**Ratkaisu:** Erotusosamäärä on sievennettynä

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{x_0^2 + 2x_0h + h^2 - x_0^2}{h} \\ &= 2x_0 + h,\end{aligned}$$

joten rajalla  $h \rightarrow 0$  saadaan derivaataksi  $f'(x_0) = 2x_0$ .

Derivaattafunktion lauseke on siis muotoa  $f'(x) = 2x$ , kun  $x \in \mathbf{R}$ .

Entä jos olisi pyydetty johtamaan funktion  $f(x) = x^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , derivaatta?

## Esimerkki

Johda funktion  $f(x) = \sin x$  derivaatta kohdassa  $x_0$ .

**Ratkaisu:** Erotusosamäärä saadaan yhteenlaskukaavan avulla muotoon

$$\begin{aligned}\frac{\sin(x_0 + h) - \sin(x_0)}{h} &= \frac{\sin x_0 \cos h + \cos x_0 \sin h - \sin x_0}{h} \\ &= \cos x_0 \frac{\sin h}{h} + \sin x_0 \frac{\cos h - 1}{h}.\end{aligned}$$

Osoittamalla, että

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \quad \text{ja} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0,$$

niin derivaataksi saadaan  $f'(x_0) = \cos x_0 \cdot 1 + \sin x_0 \cdot 0 = \cos x_0$ .

Että  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$  johdettiin jo geometrisesti ja suppiloperiaatteella.

Koska

$$\begin{aligned}\frac{\cos h - 1}{h} &= \frac{(\cos h - 1)(\cos h + 1)}{h(\cos h + 1)} = \frac{\cos^2 h - 1}{h(\cos h + 1)} \\ &= -\frac{\sin h}{h} \cdot \frac{\sin h}{\cos h + 1} \rightarrow -1 \cdot \frac{0}{2} = 0,\end{aligned}$$

kun  $h \rightarrow 0$ , niin saadaan jälkimmäinen raja-arvo.

Toisella rivillä käytettiin identiteettiä  $\sin^2 h + \cos^2 h = 1$ .

- Lineaarisuus

$$D(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$$

$$D(cf(x)) = cf'(x), \text{ kun } c \in \mathbf{R} \text{ on vakio}$$

- Tulon derivoimissääntö

$$D(f(x)g(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- Osamäärän derivoimissääntö

$$D\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

- Yhdistetyn funktion derivoimissääntö

$$D(f(g(x))) = f'(g(x))g'(x)$$

Viimeiselle kaavalle käytetään nimitystä **ketjusääntö** = Chain Rule.

- $D(\text{vakiofunktio}) = 0$
- $D(x^r) = rx^{r-1}$ ,  $r \neq 0$
- $D(\sin x) = \cos x$ ,  $D(\cos x) = -\sin x$
- $D(\tan x) = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ , kun  $x \neq \pi/2 + n\pi$
- $De^x = e^x$ ,  $D \ln |x| = 1/x$ , kun  $x \neq 0$   
(näihin palataan myöhemmin)

Käytännössä derivaatat voidaan laskea laskusääntöjen ja jo tunnettujen yksinkertaisempien derivaattojen avulla:

- $D(x^3 - 4x^2 + 6) = 3x^2 - 8x$
- $D(\sqrt{1 + 5x^2}) = \frac{1}{2}(1 + 5x^2)^{-1/2}D(1 + 5x^2) = \frac{5x}{\sqrt{1 + 5x^2}}$
- $D(x^2 \cos(3x)) = D(x^2) \cos(3x) + x^2 D(\cos(3x))$   
 $= 2x \cos(3x) + x^2(-\sin(3x) \cdot D(3x))$   
 $= 2x \cos(3x) - 3x^2 \sin(3x)$
- $D(\sin(1/x)) = \cos(1/x)D(1/x)$   
 $= \cos(1/x) \cdot (-1/x^2)$   
 $= -\cos(1/x)/x^2, \text{ kun } x \neq 0$

Kaksi viimeistä läpi taululla.

# Derivoituva funktio on jatkuva

## Lause

*Jos  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  on derivoituva pisteessä  $x_0 \in ]a, b[$ , niin se on jatkuva pisteessä  $x_0$ .*

**Perustelu:** Derivaatan määritelmästä saadaan

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \varepsilon(x_0, h)$$

missä  $\varepsilon(x_0, h)$  on raja-arvoon liittyvä virhetermi, jolle  $\varepsilon(x_0, h) \rightarrow 0$  kun  $h \rightarrow 0$ .

Niinpä

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + h\varepsilon(x_0, h) \rightarrow 0 \text{ kun } h \rightarrow 0.$$

## Lause

*Jos  $f$  on derivoituva paikallisessa ääriarvokohdassa  $x_0 \in ]a, b[$ , niin  $f'(x_0) = 0$ .*

**Perustelu:** Tarkastellaan paikallista maksimia pisteessä  $x_0$ .

Erotusosamäärän toispuoleiset raja-arvot ovat erimerkkiset paikallisessa ääriarvokohdassa, koska

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{\text{negatiivinen}}{\text{positiivinen}} \leq 0, \text{ kun } h > 0,$$
$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{\text{negatiivinen}}{\text{negatiivinen}} \geq 0, \text{ kun } h < 0$$


ja  $|h|$  on niin pieni, että  $f(x_0)$  on maksimi välillä  $[x_0 - h, x_0 + h]$ .

Koska  $f$  on derivoituva  $x_0$ :ssa, nämä toispuoliset raja-arvot ovat yhtäsuuria: siis molemmat  $= 0$ .

## Lause

Jos  $f$  on jatkuva välillä  $[a, b]$  ja lisäksi derivoituva avoimella välillä  $]a, b[$ , niin on olemassa sellainen piste  $c \in ]a, b[$ , että


$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad \text{ts.} \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$



Väliarvolauseen todistus: Sovelletaan Rollen lausetta apufunktioon

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

joka toteuttaa  $g(a) = g(b) = 0$ . Sen paikallisessa ääriarvokohdassa (**miksi olemassa?**)  $c \in ]a, b[$  pätee  $g'(c) = 0 \Leftrightarrow f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ .



- Jos  $f'(x) = 0$  kaikissa avoimen välin pisteissä  $x$ , niin  $f$  on vakiofunktio tällä välillä.
- Jos  $f'(x) \geq 0$  jollakin välillä, niin  $f$  on kasvava tällä välillä; jos  $f'(x) \leq 0$  jollakin välillä, niin  $f$  on vähenevä tällä välillä.
- Jos edellisen kohdan lisäksi  $f'(x) = 0$  ainoastaan yksittäisissä pisteissä, niin  $f$  on **aidosti** kasvava/vähenevä.  
Esimerkki:  $f(x) = x^3$ .

Tarkastellaan nämä taululla.

# L'Hospitalin sääntö I

Raja-arvojen laskeminen derivaatan avulla; erilaisia versioita mm. tyyppiä " $0/0$ " tai " $\infty/\infty$ " oleville raja-arvoille; myös toispuoleisille.

Tärkein tapaus:

## Lause

*Oletetaan, että  $f(x_0) = g(x_0) = 0$  ja funktiot  $f, g$  ovat derivoituvia jollakin välillä  $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ . Jos*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

*on olemassa, niin*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

# l'Hospitalin sääntö II

## Perustelu:

Erikoistapauksessa  $g'(x_0) \neq 0$  perustelu on lyhyt:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{(f(x) - f(x_0))/(x - x_0)}{(g(x) - g(x_0))/(x - x_0)} \rightarrow \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

Yleisessä tapauksessa tarvitaan ns. yleistettyä väliarvolausetta, jonka mukaan

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

jossakin pisteessä  $c \in ]x_0, x[$ . Tällöin osoittajassa ja nimittäjässä on sama piste  $c$ , joten edes derivaattojen jatkuvuutta ei tarvita!

# l'Hospitalin sääntö III

## Esimerkki

Laske raja-arvo  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{x}$ .

**Ratkaisu:** Koska  $\sin(4x)/x$  on muotoa "0/0" kohdassa  $x = 0$ , niin voidaan (yrittää) soveltaa l'Hospitalin sääntöä:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \cos(4x)}{1} = 4.$$

Koska derivoidulla muodolla on raja-arvo 4, niin lasku on pätevä.

**Huom. 1:** Jos derivoitu raja-arvo on edelleen muotoa "0/0", niin sääntöä voidaan yrittää käyttää toisen (tai useamman) kerran.

**Huom. 2:** Muoto "0/0" on aina tarkistettava:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1} = 0.$$

# Ääriarvotehtävät I

Seuraavassa  $A \subset \mathbb{R}$  on väli.

- Funktiolla  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  on paikallinen maksimi/minimi pisteessä  $x_0 \in A$ , jos  $x_0$  on funktion  $f$  maksimi-/minimikohta jollakin välillä  $A \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ .
- Paikallinen ääriarvo = paikallinen maksimi tai minimi; voi esiintyä myös määrittelyvälin päätepisteessä.
- Paikallinen ääriarvo voi olla ainoastaan joko
  - (i) derivaatan nollakohdassa,
  - (ii) määrittelyvälin päätepisteessä, tai
  - (iii) sellaisessa kohdassa, jossa funktio ei ole derivoituva.
- Jos tiedetään etukäteen, että funktiolla on maksimi/minimi, niin etsitään kaikki mahdolliset paikalliset ääriarvokohdat (vrt. edellinen), lasketaan niissä funktion arvot ja **valitaan** näistä suurin/pienin.

## Esimerkki

Määritä funktion  $f: [0, 2] \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) = x^3 - 6x$ , suurin ja pienin arvo.

**Ratkaisu:** Derivaatan nollakohdat:  $f'(x) = 3x^2 - 6 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$ .  
Koska  $-\sqrt{2} \notin [0, 2]$ , niin lasketaan arvot  $f(0) = 0$ ,  $f(\sqrt{2}) = -4\sqrt{2}$ ,  
 $f(2) = -4$ , joista voidaan valita funktion pienin arvo  $-4\sqrt{2}$  ja suurin arvo 0.

- **Kupera** eli **konvekksi** alue  $D \subset \mathbb{R}^2$ : jos  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ , niin myös niiden välinen yhdysjana  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \subset D$
- Välillä  $I \subset \mathbb{R}$  määritelty funktio on **kupera** eli konvekksi, jos sen kuvaajan yläpuolinen tasoalue on kupera; tähän riittää se että kuvaajalle piirretyt sekantit ovat aina kuvaajan yläpuolella, kaavana

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y), \text{ kun } x, y \in I, t \in [0, 1].$$

- Erityisesti: jos  $f''(x) \geq 0$  koko välillä, niin  $f$  on konvekksi
- Funktion käännepiste: kohta, jossa kuvaajalla on tangentti ja funktion kuperuussuunta vaihtuu. Esimerkiksi, jos  $f''(x)$  vaihtaa merkkiä.
- Jos funktion  $f$  derivaatan nollakohdassa  $x_0$  on  $f''(x_0) < 0$ , niin kyseessä on paikallinen maksimi; jos  $f''(x_0) > 0$ , niin kyseessä on paikallinen minimi. Tapauksessa  $f''(x_0) = 0$  tilannetta täytyy tutkia tarkemmin.