

MS-A0201

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM)

Luento 4: Ketjusäännöt ja lineaarinen approksimointi

Harri Hakula

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos<sup>1</sup>  
Aalto-yliopisto

Kevät 2020

---

<sup>1</sup>Perustuu Antti Rasilan luentomonisteeseen vuodelta 2015 sekä Jarmo Malisen versioon vuodelta 2017.

# Motivaatio

- Yleistetään derivoinnin ketjusääntö

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

usean muuttujan funktioille  $f$ .

- Voidaan ajatella fysikaalista suuretta kuten lämpötilaa, mekaanisen systeemin kokonaisenergiaa, jotka riippuvat useista eri toissijaisista muuttujista (kuten ajasta, paikasta, tai nopeudesta).
- Nämä muuttujat voivat riippua edelleen kolmansista muuttujista (paikka ja nopeus esimerkiksi ajasta).
- Halutaan tarkastella kiinnostavan fysikaalisen suureen muutosnopeutta mainittujen kolmansien muuttujien suhteen.

## Esimerkki 1 1/2

- Retkeilijä liikkuu karttaa käyttäen mäkisessä maastossa. Olkoon  $(x, y)$  retkeilijän paikka kartalla ja  $z = f(x, y)$  kulloinenkin korkeus meren pinnasta.

- Olkoon

$$\mathbf{r}(t) = (u(t), v(t))$$

retkeilijän paikka kartalla hetkellä  $t$ .

- Retkeilijän paikan korkeus eli etäisyys meren pinnan tasosta hetkellä  $t$  on siis yhdistetty funktio

$$z = f(u(t), v(t)) = g(t).$$

- Kuinka nopeasti retkeilijän paikan korkeus muuttuu ajan kuluessa?

## Esimerkki 1 2/2

- Ilmeisestikin vastaus kysymykseen on funktion  $g(t)$  derivaatta.  
Lasketaan:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t+h) - g(t)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(u(t+h), v(t+h)) - f(u(t), v(t))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(u(t+h), v(t+h)) - f(u(t), v(t+h))}{h} \\ &\quad + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(u(t), v(t+h)) - f(u(t), v(t))}{h}\end{aligned}$$

- Yhden muuttujan ketjusäännön perusteella

$$g'(t) = f_1(u(t), v(t))u'(t) + f_2(u(t), v(t))v'(t).$$

## Ketjusäännöt 1/3

Olkoon  $z$  muuttujien  $x, y$  jatkuvasti derivoituva funktio (eli funktio, jolla on jatkuvat 1. kertaluvun osittaisderivaatat).

- Jos  $x, y$  ovat muuttujan  $t$  jatkuvasti derivoituvia funktioita, niin

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

- Jos  $x, y$  ovat kahden muuttujan  $s, t$  jatkuvasti derivoituvia funktioita, niin

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

ja

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}.$$

## Ketjusäännöt 2/3

Keskeisiä kysymyksiä:

- Mikä on yleinen idea näissä kaavoissa?
- Kuinka voidaan muodostaa yleisessä tapauksessa laskentakaava yhdistetyn funktion (osittais)derivaatoille?

Ajatellaanpa, että  $z = f(u, v, t)$ , jossa  $u = u(x, y)$  ja  $v = v(y, t)$ . Tarkastellaan graafina “infinitesimaalisen muutoksen etenemistä” muuttujasta  $t$  muuttujaan  $z$  kaikkien etenemisreittien kautta.

- Piirrä muuttujien väliset riippuvuudet graafiksi, ja kirjoita sen perusteella kaava osittaisderivaatalle  $\frac{\partial z}{\partial t}$ !
- Kuinka tilanne muuttuu, jos lisäksi  $x = x(t)$  ja  $y = y(t)$  jolloin  $z = z(t)$  ja kysytään kaavaa derivaatalle  $\frac{dz}{dt}$ ?

## Ketjusäännöt 3/3

Saadaan

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

ja

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial u} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left( \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) + \frac{\partial f}{\partial t},$$

jossa on yhteensä viisi termiä.

Huomaa, että on käytetty sekä notaatiota  $\frac{\partial z}{\partial t}$  että  $\frac{\partial f}{\partial t}$ , jotka tarkoittavat eri asioita!

## Esimerkki 2 1/2

- Olkoon  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  jatkuvasti derivoituva. Etsitään

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x^2 y, x + 2y) \text{ ja } \frac{\partial}{\partial y} f(x^2 y, x + 2y).$$

- Saadaan

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} f(x^2 y, x + 2y) &= f_1(x^2 y, x + 2y) \frac{\partial}{\partial x} (x^2 y) \\ &\quad + f_2(x^2 y, x + 2y) \frac{\partial}{\partial x} (x + 2y) \\ &= 2xy f_1(x^2 y, x + 2y) + f_2(x^2 y, x + 2y). \end{aligned}$$



## Esimerkki 2 2/2

- Vastaavasti voidaan laskea

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y} f(x^2 y, x + 2y) &= f_1(x^2 y, x + 2y) \frac{\partial}{\partial y} (x^2 y) \\ &\quad + f_2(x^2 y, x + 2y) \frac{\partial}{\partial y} (x + 2y) \\ &= x^2 f_1(x^2 y, x + 2y) + 2f_2(x^2 y, x + 2y).\end{aligned}$$

## Esimerkki 3 1/3

- Lämpötila ilmakehässä ( $^{\circ}\text{C}$ ) riippuu paikasta  $(x, y, z)$  sekä ajasta  $t$ . Ajatellaan lämpötilaa näistä parametreista riippuvana funktiona  $T(x, y, z, t)$ .

- (a) Jos funktio  $T$  esittää sääpalloon liitetyn lämpömittarin mittaamaa lämpötilaa, määritetään  $T$ :n muutos ajan suhteen.
- (b) Määritetään lämpötilan muutos hetkellä  $t = 1$ , kun

$$T(x, y, z, t) = \frac{xy}{1+z}(1+t),$$

ja sääpallo etenee reittiä  $\mathbf{r}(t) = (t, 2t, t - t^2)$ .

## Esimerkki 3 2/3

- (a) Koska lämpömittarin lukeman muutos riippuu kaikista neljästä parametrasta, mitään niistä ei voida jättää huomiotta.

Lämpötilan muutoksen kaavaksi saadaan siten

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial T}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial T}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial T}{\partial t}.$$

- (b) Koordinaattifunktioiden arvot hetkellä  $t = 1$  ovat

$$x = 1, \quad y = 2 \text{ ja } z = 0.$$

Koordinaattifunktioiden derivaattojen arvot hetkellä  $t = 1$  ovat

$$\frac{dx}{dt} = 1, \quad \frac{dy}{dt} = 2 \text{ ja } \frac{dz}{dt} = -1.$$

## Esimerkki 3 3/3

Siten hetkellä  $t = 1$  saadaan

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{y}{1+z}(1+t) = 4, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{x}{1+z}(1+t) = 2,$$

$$\frac{\partial T}{\partial z} = \frac{-xy}{(1+z)^2}(1+t) = -4, \quad \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{xy}{1+z} = 2.$$

Näin ollen,

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=1} = 4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + (-4) \cdot (-1) + 2 = 14.$$

# Lineaariset approksimaatiot

- Yksiulotteisessa tapauksessa muotoa  $y = f(x)$  olevan funktion kuvaajan tangentsuora  $L(x)$  pisteessä  $a$  saadaan kaavasta

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

- Tangentsuoran lauseke antaa myös tavan approksimoida funktiota  $f$  pisteen  $a$  lähellä:  $f(x) \approx L(x)$ .

Miksi approksimaatiota tarvitaan, jos kerran tietokone voi laskea nopeasti ja tarkasti?

- Kun halutaan löytää “peukalosääntö” päässälaskun helpottamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi.
- Kun funktio  $f$  on olemassa ainoastaan taulukoituna, esimerkiksi mittaustuloksista.

# Lineaariset approksimaatiot usean muuttujan funktioille

Tapauksessa  $n = 2$  saadaan funktiota  $f(x, y)$  approksimoiva tangenttitaso  $L(x, y)$ , joka voidaan laskea osittaisderivaattojen avulla kaavasta

$$f(x, y) \approx L(x, y) = f(a, b) + f_1(a, b)(x - a) + f_2(a, b)(y - b).$$

Vieläkin useamman muuttujan tapauksessa saadaan ihan samannäköinen kaava, joskin enemmän osittaisderivaattatermejä.

## Esimerkki 6 1/2

- Etsitään lineaarinen approksimaatio funktiolle

$$f(x, y) = \sqrt{2x^2 + e^{2y}}$$

pisteessä  $(2, 0)$ , ja arvioidaan funktion arvoa pisteessä  $(2.2, -0.2)$ .

- Saadaan  $f(2, 0) = 3$ .
- Funktion osittaisderivaatat ovat

$$f_1(x, y) = \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + e^{2y}}}, \quad f_1(2, 0) = \frac{4}{3}.$$

$$f_2(x, y) = \frac{e^{2y}}{\sqrt{2x^2 + e^{2y}}}, \quad f_2(2, 0) = \frac{1}{3}.$$

## Esimerkki 6 2/2

- Siten

$$L(x, y) = 3 + \frac{4}{3}(x - 2) + \frac{1}{3}(y - 0).$$

- Haluttu approksimaatio siis on

$$f(2.2, -0.2) \approx L(2.2, -0.2) = 3 + \frac{4}{3}(2.2 - 2) + \frac{1}{3}(-0.2 - 0) = 3.2.$$

- Vertailun vuoksi funktion  $f(x, y)$  todellinen arvo pisteessä  $(2.2, -0.2)$  on noin 3.2172.



# Huomautuksia

- Toisin kuin yksiulotteisessa tapauksessa pelkkä osittaisderivaattojen olemassaolo ei riitä takaamaan edes funktion  $f(x, y)$  jatkuvuutta.

- **Esim.**

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{kun } x = 0 \text{ tai } y = 0, \\ 1, & \text{muuten.} \end{cases}$$

- **Esim.**

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & \text{kun } x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & \text{kun } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- Siksi tilannetta on tarpeen analysoida tarkemmin. Halutaan ehto, joka kertoo milloin tangenttitaso  $L(x, y)$  on mielekäs approksimaatio funktiolle  $f(x, y)$  pisteen  $(a, b)$  lähellä.

# Differentioituvuus

- Funktiota  $f(x, y)$  sanotaan differentioituvaksi pisteessä  $(a, b)$ , jos

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a+h, b+k) - f(a, b) - hf_1(a, b) - kf_2(a, b)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

- Saadaan seuraava tulos:

## Lause

Jos  $f_1, f_2$  ovat jatkuvia jossakin pisteen  $(a, b)$  ympäristössä, niin  $f$  on differentioituva pisteessä  $(a, b)$ .

## Esimerkki 7

- Lasketaan virhetermi  $f(x+h, y+k) - f(x, y) - hf_1(x, y) - kf_2(x, y)$ , kun  $f(x, y) = x^3 + xy^2$ .
- Osittaisderivaatoiksi saadaan  $f_1(x, y) = 3x^2 + y^2$  ja  $f_2(x, y) = 2xy$ .
- Saadaan

$$\begin{aligned} & f(x+h, y+k) - f(x, y) - hf_1(x, y) - kf_2(x, y) \\ &= (x+h)^3 + (x+h)(y+k)^2 - x^3 - xy^2 - (3x^2 + y^2)h - 2xyk \\ &= 3xh^2 + h^3 + 2yhk + hk^2 + xk^2. \end{aligned}$$

- Lausekeen  $h$ - ja  $k$ -termit lähestyvät nollaa samalla nopeudella kuin  $h^2 + k^2$ , kun  $(h, k) \rightarrow 0$ , joten differentioituvuuden määritelmä selvästi toteutuu.